

FUNTAK

- Aplicar 20 gramos por árbol a la base del tronco.
- Aplicación: Según nivel de infección.

TRIMAD*

- Dosis 3 kg./ha. hasta 1.000 lts. de caldo.
- Aplicación: Tres aplicaciones, con repetición cada 15 días, hasta completar tratamiento.
- Un tratamiento consta de tres aplicaciones.
- * *No mezclar con ningún fungicida, ni químico, ni biológico. Dejar un plazo de tres días, tanto anterior como posterior, para su siguiente tratamiento fungicida, sea de la índole que sea.*

DERBIOX*

- Dosis: 3 kg./ha. hasta los 1.000 lts. de caldo.
- Aplicación: Tres aplicaciones, con repetición cada 15 días, hasta completar tratamiento. Un tratamiento consta de tres aplicaciones.
- * *No mezclar con ningún fungicida, ni químico, ni biológico. Dejar un plazo de tres días, tanto anterior como posterior, para un siguiente tratamiento fungicida, sea de la índole que sea.*

NUTRIFUN*

- Dosis: 3 kg./ha. hasta 1.000 lts. de caldo.
- * *No mezclar con ningún fungicida, ni químico, ni biológico. Dejar un plazo de tres días, tanto anterior como posterior, para un siguiente tratamiento fungicida, sea de la índole que sea.*

SUCRAL

- Dosis 3 kg./ha. hasta 1.000 lts. de caldo
- No mezclar con ningún fungicida ni químico ni biológico
- Dejar un plazo de 3 días, tanto anterior como posterior para un siguiente tratamiento fungicida.
- Tres aplicaciones una en engorde y dos en envero.

ENERLAC

- Dosis de aplicación: 5 lts./ha. hasta 1.000 lts. de caldo.
- Momento de aplicación: 2 días antes de poner la colmenas.
- Aplicar solo con Biojoint.

ANTIPIIT

- Dosis: 1 l./ha. en 600 a 1.000 lts. de caldo.
- Por variedades tempranas: 4 aplicaciones cada 7-10 días.
- Por variedades tempranas: 4 aplicaciones cada 10-12 días.
- Por Variedades tempranas: 4 aplicaciones cada 12-15 días.
- Se puede mezclar con otros productos.

SUNPROT

- Dosis: 5 lts./ha. desde 1.000 lts. de caldo.
- Aplicación: Cada 10 días durante el período de máxima insolación. aplicación foliar.
- Se puede mezclar con otros productos.

CITOFORTE

- Desde 1.000 lts. de caldo.
- Aplicación: 5-7 días antes se puede mezclar con otros productos.

1. Variedades normales y efecto general

- 5 a 8 días antes de cosecha: CITOFORTE 10 l./h. + BIOJOINT 1 l./ha.

2. Variedades sensibles: blandeo, caída pedúnculo, mancha post cosecha: Early Biggi, Summit, Van, Skeena, Primi Giant...

- 20 días antes de cosecha: CITOFORTE 7 a 10 l./h. + BIOJOINT 1 l./ha.

3. Optimizar el nivel de azúcar

- 10 a 12 días antes de cosecha: CITOFORTE 10 l./h. + KRAKTENS 3 l./ha. + BIOJOINT 0 l./ha.

KRAKTENS: (programa anti-kraking).

- Kraktens: 3 lts./h. desde 1000 lts. de caldo.
- Se puede mezclar con otro producto.

1. Desde estadio H hasta cambio de color, (solo para variedades sensibles)

- Cada semana, BIOJOINT 0,5 l./ha. + KRAKTENS 0,5 l./ha.

2. Desde cambio de color (preventivo) hasta cosecha

- Cada semana, BIOJOINT 0,5 l./ha. + KRAKTENS 1 l./ha.

3. En previsión de lluvia (solamente)

- Hasta 6 horas antes de lluvia hacer: KRAKTENS 5 l./ha. + BIOJOINT 0,5 l./ha.

4. En previsión de fuerte viento y lluvia y variedades sensible a craking medio luna:

- 1 día antes (ideal) hasta 6 horas: CITOFORTE 10 l./ha. + KRAKTENS 3 l./ha. + BIOJOINT 0,5 l./ha.
- Aplicar siempre junto a BIOJOINT a 0,5 l./ha. hasta 1.000 l. de caldo.

BIOJOINT

- Carrier: 500 cc./1.000 lts. de caldo.
- Carrier en tratamientos de madera: 1 lt./1.000 lts. de caldo.
- Se puede mezclar con otro producto.



Investigación y Avance Biotecnológico S.L

Calendario Fenológico

TRATAMIENTOS DE CEREZAS



Todos estos productos no tienen plazo de seguridad.
Todos estos productos están libres de trazas químicas, teniendo cero residuos.



Investigación y Avance Biotecnológico S.L

Artes y Oficios número 1, Polígono Industrial La Hoya de Lorca
30816 Lorca | Murcia | España

