

Parada invernal				Brotación			Racimo		Floración		Cuaje		Engorde	Envero/Maduración/Recolección		
Caida de Hojas	Poda	Yema Invierno	Yema Algodón	Punta Verde	Salida Hojas	Hojas Extendidas	Racimos Visibles	Racimos Separados	Botones Florales Separados	Plena Floración	Cuajado	Grano Guisante	Cierre Racimo	Inicio Envero	Pleno Envero	Maduración

		Parada invernal	Brotación	Racimo	Floración	Cuaje	Engorde	Envero/Maduración/Recolección								
EFECTO REGENERATIVO	YESCA Enf. Madera	TRIMAD														
	OIDIO (Uncinula necator)		NUTRIFUN													
	MILDIU (Plasmopara viticola)			NUTRIFUN												
	BOTRITIS (Botrytis cinerea)				NUTRIFUN										NUTRIFUN	
FISIOPATIAS ABIOTICAS	RAJADO														KRAKTENS	
	CRACKING MEDIO LUNA														KRAKTENS	
	GOLPE DE SOL														CITOFORTE	
	PODREDUMBRE ACIDA														SUNPROT	
VIDA UTIL	AZUCAR														SUCRAL	
	CONSERVACIÓN RAQUIS														CITOFORTE	
	DESGRANE														CITOFORTE	
	FIRMEZA														CITOFORTE	
FISIOPATIAS NUTRICIONALES	Ca				ANTIPIT											
CARRIER		BIOJOINT														

Calendario Fenológico

TRATAMIENTOS DE UVA DE MESA

TRIMAD*

- Dosis 3 kg./ha. hasta 1.000 lts. de caldo.
- Aplicación: Tres aplicaciones, con repetición cada 15 días, hasta completar tratamiento.
- Un tratamiento consta de tres aplicaciones.
- * No mezclar con ningún fungicida, ni químico, ni biológico. Dejar un plazo de tres días, tanto anterior como posterior, para su siguiente tratamiento fungicida, sea de la índole que sea.

NUTRIFUN*

- Dosis: 3 kg./ha. hasta 1.000 lts. de caldo.
- * No mezclar con ningún fungicida, ni químico, ni biológico. Dejar un plazo de tres días, tanto anterior como posterior, para un siguiente tratamiento fungicida, sea de la índole que sea.

KRAKTENS

- Dosis 3 lts./ha. desde 1.000 lts. de caldo.
- Aplicar siempre junto con BIOJOINT a 500 cc. por 1.000 lts. de caldo.
- En previsión de lluvia aplicar: 5 lts. por ha. hasta 1.000 lts. de caldo. hasta 12 horas antes de la precipitación.
- Tratamiento para variedades sensibles al rajado o en períodos de alta humedad, realizar tratamientos de mantenimiento cada 10 días.
- Se puede mezclar con otros productos.

CITOFORTE

- Dosis: 7,5 lts./h. desde 1.000 lts. de caldo.
- Aplicación: 5-7 días antes de recolección. variedades con recolección superior a 20 días, hacer una nueva aplicación 15 días después de la primera aplicación.
- Se puede mezclar con otros productos.

SUNPROT

- Dosis: 5 lts./h. desde 1.000 lts. de caldo.
- Aplicación: Cada 7/10 días durante el período de máxima insolación. aplicación foliar.
- Se puede mezclar con otros productos.

ANTIPIIT

- Dosis: 0,5 lts. /ha. desde 1.000 lts. de caldo.
- Aplicación: Cuatro aplicaciones cada 15 días. aplicación foliar.
- Se puede mezclar con otros productos.

SUCRAL

- Dosis 3 kg./ha. hasta 1.000 lts. de caldo
- No mezclar con ningún fungicida ni químico ni biológico
- Dejar un plazo de 3 días, tanto anterior como posterior para un siguiente tratamiento fungicida.
- Tres aplicaciones una en engorde y dos en envero.

BIOJOINT

- Carrier: 500 cc./1.000 lts. de caldo.
- Carrier en tratamientos de madera: 1 lt./1.000 lts. de caldo.

**Todos estos productos no tienen plazo de seguridad.
Todos estos productos están libres de trazas químicas, teniendo cero residuos.**

