INVESTIGACIÓN Y AVANCE BIOTECNOLÓGICO

FICHA TÉCNICA TRIMAD (WP)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Producto perteneciente al grupo 4.1.01, según Anexo I del RD 506/2013
Unidad: 1 Kg o 3 Kg en polvo mojable.
Temperatura de aplicación: 0 a 25°C.
Temperatura de almacenaje: 0 a 35°C.
pH: 5,5
Almacenaje: guardar en lugar fresco y seco. Envase sellado. No exponer al sol.
Restricciones: ninguna.
Vida de anaquel: 2 años
No presenta acción frente a nitrobacterias.
Eficacia 15 días en invierno y verano sobre madera.
No mancha la fruta, no deja olor ni sabor.
No afecta la vinificación desde la fermentación hasta el final del proceso.
Por su composición, no hay plazo de seguridad.
Usar agua con pH neutro.
No afecta a fauna útil ni abejas.
No afecta a artrópodos.

INCOMPATIBILIDADES
Incompatible con pesticidas químicos.
No debe mezclarse con abonos y productos fitosanitarios de naturaleza química.
Los abonos de naturaleza alcalina podrían resultar agentes neutralizantes del producto.
No mezclar con otros productos.
El tanque del equipo de tratamiento debe de estar libre de residuos de tratamientos anteriores.

PROPIEDADES FÍSICOS QUÍMICAS NUTRIFUN

Presentación	:	Polvo mojable
Aspecto	:	Polvo Micronizado
Estado físico	:	Sólido
Color	:	Verde, cuya intensidad puede variar entre lotes, sin ser indicador de actividad biológica
Olor	:	Esencia de coco
Densidad (25°C)	:	1,96 g/mL
Humedad relativa (25°C)	:	8%
Estabilidad	:	Producto estable en condiciones de almacenaje normal, en envase original y cerrado

LIBRE DE PATOGENOS DE SUPERFICIE y LIQUIDOS.

RIQUEZA MINIMA GARANTIZADA en % P/P

Nitrógeno total	:	3,34%
Nitrógeno orgánico	:	2,55%
Aminoácidos libres	:	11%

K_2O	:	0,20%
P_2O_5	:	0,24%

AMINOGRAMA en % P/P			
Asp	1,099	Met	0,183
Gaba	0,057	Ile	0,247
Tre	0,848	Leu	0,469
Ser	1,718	Tyr	0,084
Glu	1,819	Phe	0,205
Gly	0,783	Lys	0,242
Ala	0,909	His	0,021
Cys	0,195	Arg	0,164
Val	0,777	Pro	1,279

TRIMAD es un bioestimulante nutricional de aplicación indicada en frutales y vides, formulado especialmente con L-aminoácidos libres lo que potencia la actividad metabólica en zonas estructurales en el interior del sistema vascular y sobre la estructura leñosa, disminuyendo la presión xilemática y estimulando el crecimiento de brotes apicales. Gracias a su acción translaminar, no necesita un follaje abundante para ejercer su acción.

Cultivo	**Observaciones**	**Dosis**
Fruta de hueso	Desde inicio de brotación cada 15 días. 3 aplicaciones.	TRIMAD 3 Kg Por Há en 1000 L de agua
Fruta de pepita	Desde inicio de brotación cada 15 días. 3 aplicaciones.	
Uva de mesa y vinífera	Desde yema algodonosa. 3 aplicaciones cada 15 días.	
Kiwi y frutales tropicales	Desde inicio de brotación cada 15 días. 3 aplicaciones.	
Árboles ornamentales, viveros	Desde inicio de brotación cada 15 días. 3 aplicaciones.	

Nota: en caso de hacer una dilución en un volumen inferior a 100 litros de agua, utilizar 10 a 15 g de Trimad por litro de agua.